

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA)
Sub Dirección Técnica de Sanidad Vegetal
Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitarias

ALERTA FITOSANITARIA

PLAGA DE IMPORTANCIA CUARENTENARIA PARA HONDURAS

Chinche de las Leguminosas Megacopta Cribraria



Adulto



Huevecillos

Daños



Chinche de las Leguminosas *Megacopta cribraria*

Generalidades

Chinche de color marrón oscuro con punciones múltiples a lo largo de la cara dorsal de la región abdominal, su tamaño varía de 3 a 5 mm de largo y pueden tener de una a tres generaciones por año. Presentan un apetito voraz por el kudzu pero pueden afectar numerosos cultivos agrícolas: soja, frijol, habas, judías, etc.

Su daño se refleja en los peciolos y vainas causando marchitamiento de las semillas, provocando un impacto negativo en el rendimiento productivo de la planta de entre 30% y 50% .

Su mayor actividad la realiza cuando el clima es cálido, cuando el clima está frío tiende a refugiarse en las casas o bodegas de almacenamiento de granos. Actualmente se ha reportado en EE.UU y China., donde se hacen estudios de su control por medio del parasitoide *Dirphys boswelli*.



Si observa esta Plaga
contáctenos:
SENASA Tegucigalpa 2232-6213,
2235-8160, 2239-7270.
Oficinas Regionales
[http:// www.senasa-sag.gov.hn](http://www.senasa-sag.gov.hn)

